

# Ciherang

Nomor seleksi	S3383-1d-Pn-41-3-1
Asal seleksi	: IR18349-53-1-3-1-3/3*IR19661-131-3-1-3//4*IR64
Umur tanaman	: 116-125 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 107-115 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 23 %
Indeks glikemik	: 54,9
Rata – rata hasil	: 5 – 7 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2, agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, rentan terhadap strain IV dan VIII
Anjuran tanam	: Baik ditanam disawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl.
Pemulia	: Tarjat T, Z. A. Simunallang, E. Sumadi, dan Aan A. Daradjat.
Dilepas tahun	: 2000

# Mekongga

Nomor seleksi	: S4663-5d-Kn-5-3-3
Asal seleksi	: A2790/2*IR64
Umur tanaman	: 116-125 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 91-106 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping panjang
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 23 %
Indeks glikemik	: 88
Potensi hasil	: 6 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain IV.
Anjuran tanam	: Baik ditanam di sawah dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl.
Pemulia	: Z. A. Simanullang, Idris Hadade, Aan A. Daradjat, dan Sahardi.
Dilepas tahun	: 2004

# Inpari 1

Nomor seleksi	BP23F-PN-11
Asal seleksi	: IR64/1/IRBB-7//IR64
Umur tanaman	: 108 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 93 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 22%
Indeks glikemik	: 50,4 (Gak ada *di SK)
Rata – rata hasil	: 7,3 t/ha GKG
Potensi hasil	: 10 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 2, agak tahan terhadap biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, IV, dan VIII.
Anjuran tanam	: Baik ditanam pada lahan sawah dataran rendah sampai dengan ketinggian ±500 m dpl.
Pemulia	: Bambang Kustianto, Supartopo, Soewito TJ, Buang Abdullah, Sularjo, Aris Hairmansis, Heni Safitri, dan Suwarno.
Dilepas tahun	: 2008

# Inpari 2

Nomor seleksi	: BP1356-1G-KN-4
Asal seleksi	: Tajum/ Maros/Maros
Umur tanaman	: 115 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 85-95 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami dengan garis-garis coklat
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 18,55%
Rata – rata hasil	: 5,83 t/ha
Potensi hasil	: 7,30 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap hama wereng batang coklat biotipe 1,2 dan 3
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak tahan terhadap tungro inokulum varian 013 dan 031.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam diekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat dan Bambang Suprihatno.
Dilepas tahun	: 2008

# Inpari 3

Nomor seleksi	: BP3448E-4-2
Asal seleksi	: Digul/BPT164C-68-7-2
Umur tanaman	: 110 hari
Bentuk tanaman	: Sedang
Tinggi tanaman	: 95-100 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 20,57 %
Rata – rata hasil	: 6,05 t/ha
Potensi hasil	: 7,52 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2 dan agak rentan terhadap biotipe 3
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak tahan terhadap tungro inokulum varian 073, 013, dan 031.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam dilahan irigasi dengan ketinggian sampai 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat dan Bambang Suprihatno.
Dilepas tahun	: 2008

# Inpari 4

Nomor seleksi	: BP2280-1E-12-2
Asal seleksi	: S4384F-14-1/Way Apo Buru/S4384F-14-1
Umur tanaman	: 115 hari
Bentuk tanaman	: Sedang
Tinggi tanaman	: 95-105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 21,07 %
Rata – rata hasil	: 6,04 t/ha
Potensi hasil	: 8,80 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV serta agak rentan terhadap strain VIII, agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain IV, agak tahan virus tungro inokulum varian 073 dan 031
Anjuran tanam	: Cocok ditanam dilahan irigasi dengan ketinggian sampai dengan 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat dan Bambang Suprihatno..
Dilepas tahun	: 2008

# Inpari 5 Merawu

Nomor seleksi	IR65600-21-2-2
Asal seleksi	: SHEN NUNG 89-366/ Ketan Lumbu
Umur tanaman	: 115 hari
Bentuk tanaman	: Sedang
Tinggi tanaman	: 100-105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang dan agak gemuk
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 23,91%
Rata – rata hasil	: 5,74 t/ha
Potensi hasil	: 7,20 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap strain IV dan VIII, rentan terhadap tungro inokulum varian No. 073, agak tahan terhadap tungro inokulum varian No. 031 dan 013.
Anjuran tanam	: Cocok untuk ditanam diekosistem sawah sampai dengan ketinggian 600 m dpl
Pemulia	: Aan A. Daradjat dan Bambang Suprihatno.
Dilepas tahun	: 2008

# Inpari 6 Jete

Nomor seleksi	: BP205D-KN-78-1-8
Asal seleksi	: Dakava line 85/ Membramo
Umur tanaman	: 118 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 100 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Sedang Ramping
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Sangat Pulen
Kadar Amilosa	: 18%
Indeks gilemik	: 66,2
Rata – rata hasil	: 6,82 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,60 t/ha GKG; 12 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap hama wereng batang cokelat biotipe 2 dan 3
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, IV, dan VIII.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam disawah dataran rendah sampai sedang ( $\pm 600$ m dpl).
Pemulia	: Buang Abdullah, Soewito T, Sularjo, dan Bambang Kustianto.
Dilepas tahun	: 2008



# Inpari 7 Lanrang

Nomor seleksi	: RUTTST96B-15-1-2-2-2-1
Asal seleksi	: S3054-2D-12-2/Utri Merah-2
Umur tanaman	: 110-115 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: $\pm$ 104 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang (P=7,1 mm, L= 2,2 mm, P/L= 3,2 mm)
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 20,78%
Rata – rata hasil	: 6,2 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,7 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV, agak rentan terhadap ras VIII serta agak tahan terhadap tungro inokulum varian No.013. Rentan terhadap tungro inokulum varian No.073 dan 031.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam disawah dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Nafisah, dan Bambang Suprihatno.
Dilepas tahun	: 2009

# Inpari 8

Nomor seleksi	: IR73012-15-2-2-1
Asal seleksi	: IR68064-18-1-1-2-2/ IR61979-138-1-3-2-2
Umur tanaman	: $\pm$ 125 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: $\pm$ 105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang dan ramping (P= 6,8 mm, L= 2,1 mm, P/L= 3,2 mm)
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 21 %
Rata – rata hasil	: $\pm$ 6,3 t/ha
Potensi hasil	: $\pm$ 9,9 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak rentan terhadap patotipe IV dan VIII, tahan terhadap tungro inokulum varian No.013 dan 031. Agak tahan terhadap tungro inokulum varian No.073.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam dilahan irigasi dengan ketinggian sampai dengan 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Nafisah, dan Bambang Suprihatno.
Dilepas tahun	: 2009

# Inpari 9 Elo

Nomor seleksi	: IR73005-69-1-1-2
Asal seleksi	: IR65469-161-2-2-2-3-2-2/ IR61979-138-1-3-2-2
Umur tanaman	: $\pm 125$ hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: $\pm 113$ cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang dan ramping (P= 6,8 mm, L= 2,1 mm, P/L= 3,3 mm)
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 20,46 %
Rata – rata hasil	: $\pm 6,4$ t/ha GKG
Potensi hasil	: $\pm 9,3$ t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap strain IV dan VIII, tahan terhadap tungro inokulum varian No.013. Agak tahan terhadap tungro inokulum varian No.073 dan 031
Anjuran tanam	: Cocok ditanam dilahan irigasi dengan ketinggian sampai dengan 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Nafisah, dan Bambang Suprihatno.
Dilepas tahun	: 2009

# Inpari 10 Laeya

Nomor seleksi	: S3382-2d-Pn-4-1
Asal seleksi	: S487b-5/2*IR19661// 2*IR64
Umur tanaman	: ±112 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±110 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang dan ramping (P= 8,6 mm, L= 2,3 mm, P/L= 3,9 mm)
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 22 %
Rata – rata hasil	: 4,8 t/ha GKG kadar air 14%
Potensi hasil	: 7,0 t/ha GKG kadar air 14%
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1 dan 2.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan strain IV, rentan terhadap tungro inokulum varian No.013, 031, dan 131.
Anjuran tanam	: Dapat ditanam pada musim hujan dan kemarau, cocok dilahan sawah dengan sistem irigasi berselang 5-7 hari sekali.
Pemulia	: Z.A. Simanulang, Nafisah, Atito D, Idris Hadade, Aan A. Daradjat, Bambang Suprihatno, dan M. Yamin Samaullah.
Dilepas tahun	: 2009

# Impari 11

Nomor seleksi	: BP1178-2F-26
Asal seleksi	: Cisadane/ IR54742-1-19-11-8
Umur tanaman	: ±105 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±106 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 21,4 %
Rata – rata hasil	: 6,5 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,8 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak tahan terhadap patotipe IV dan VIII, tahan terhadap blas ras 033 dan 133. Rentan terhadap ras 073 dan 173, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok untuk ditanam disawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Bambang S., Nafisah, Cucu Gunarsih, Trias Sitaresmi, dan M. Yamin Samaullah.
Dilepas tahun	: 2010

# Inpari 12

Nomor seleksi	: OM2395
Asal seleksi	: IR63356-SEL/ TN1
Umur tanaman	: $\pm 99$ hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: $\pm 99$ cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pera
Kadar Amilosa	: 26,4 %
Indeks Gilemik	: 53
Rata – rata hasil	: 6,2 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,0 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, agak rentan terhadap biotipe 3
• Penyakit	: Agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, IV, dan VII, tahan terhadap blas ras 033, sgak tahan terhadap ras 133 dan 073, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam diekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Bambang Suprihatno, Aan A. Dardajat, Nafisah, Cucu Gunarsih, Trias Sitaresmi, dan M. Yamin Samaullah
Dilepas tahun	: 2010

# Inpari 13

Nomor seleksi	: OM1490
Asal seleksi	: OM606/IR18348-36-3-3
Umur tanaman	: ±99 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±102 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 22,40 %
Indeks Gilemik	: 45
Rata – rata hasil	: 6,6 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,0 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	: Agak rentan terhadap hawar daun bakteri strain III, IV, dan VIII, tahan terhadap blas ras 033, agak tahan terhadap ras 133, 073, dan 173, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam diekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Nafisah, Cucu Gunarsih, Bambang S., Aan A. Daradjat, Trias Sitaresmi, M. Yamin Samaullah.
Dilepas tahun	: 2010

# Inpari 14 Pakuan

Nomor seleksi	: BP3308B-2E-5-B*4
Asal seleksi	: Cipeundeuy C/Carreon// Wae Apo Buru/// IR64
Umur tanaman	: ±113 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 103 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 22,5 %
Rata – rata hasil	: 6,6 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,2 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan terhadap biotipe 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV, agak rentan terhadap patotipe 8, agak tahan terhadap blas ras 033 dan 133, rentan terhadap ras 073, dan 173, dan rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi.
Dilepas tahun	: 2011



# Inpari 15 Parahyangan

Nomor seleksi	: BP3244-2E-8-8-3-3-1*B
Asal seleksi	: TB168E-TB-4-0-1/ Widas// IR64
Umur tanaman	: ±117 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 20,7 %
Rata – rata hasil	: 6,1 t/ha GKG
Potensi hasil	: 7,5 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, agak rentan terhadap biotipe 2, serta rentan terhadap biotipe 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak rentan terhadap patotipe IV dan VIII, tahan terhadap blas ras 033, agak tahan terhadap ras 133 dan 073, rentan terhadap ras 173, serta rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi.
Dilepas tahun	: 2011

# Inpari 16 Pasundan

Nomor seleksi	: BP3412-2E-12-3-3-1*B
Asal seleksi	: Ciherang/ Cisadane// Ciherang
Umur tanaman	: 118 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 102 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 22,7 %
Rata – rata hasil	: 6,3 t/ha GKG
Potensi hasil	: 7,6 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan rentan biotipe 3
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak rentan patotipe IV dan VIII, tahan penyakit blas ras 033, agak tahan ras 073, rentan ras 133 dan 173, serta rentan virus tungro
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi.
Dilepas tahun	: 2011

# Inpari 17

Nomor seleksi	: B10531E-KN-15-2-0-LR-B378-2
Asal seleksi	: Bio9-MR-V3-11-PN-5// IR64* <sup>3</sup> /IRBB21
Umur tanaman	: ±111 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pera
Kadar Amilosa	: 26 %
Rata – rata hasil	: 6,2 t/ha GKG
Potensi hasil	: 7,9 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan terhadap biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, IV, dan VIII, tahan terhadap blas ras 033 dan 133, agak tahan terhadap ras 073, rentan terhadap ras 173, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl dan tidak dianjurkan ditanam di daerah endemik tungro
Pemulia	: Buang Abdullah, Bambang Kustianto, Suwarno, dan Sularjo.
Dilepas tahun	: 2011

# Inpari 18

Nomor seleksi	: B10970C-MR-4-2-1-1-1-Si-3-2-4-1
Asal seleksi	: BP364B-33-3-PN-5-1/ Bio530B-45-9-3-1
Umur tanaman	: ±102 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±93 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang/ramping
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 18,0 %
Rata – rata hasil	: 6,7 t/ha GKG
Potensi hasil	: 9,5 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, agak tahan terhadap biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap patotipe IV, rentan terhadap patotipe VIII.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam dilahan irigasi dan tadah hujan dengan ketinggian 0-600 m dpl.
Pemulia	: Buang Abdullah, Sularjo, Bambang Kustianto, dan Heni Safitri.
Dilepas tahun	: 2011

# Inpari 19

Nomor seleksi	: B11283-6C-PN-5-MR-2-3-Si-1-2-1-1
Asal seleksi	: BP342B-MR-1-3/ BP226E-MR-76
Umur tanaman	: 104 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 102 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang/ramping
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 18,0 %
Rata – rata hasil	: 6,7 t/ha GKG
Potensi hasil	: 9,5 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, agak tahan terhadap biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap patotipe IV, rentan terhadap patotipe VIII.
Anjuran tanam	: Cocok untuk ditanam dilahan irigasi dan tadah hujan dengan ketinggian 0-600 m dpl.
Pemulia	: Buang Abdullah, Sularjo, Bambang Kustianto, dan Heni Safitri.
Dilepas tahun	: 2011

# Inpari 20

Nomor seleksi	: BP2080-2E-KN-6-1
Asal seleksi	: S2823E-KN-33/ IR64// S2823E/ KN/ 33
Umur tanaman	: ±104 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±102 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Mudah
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 21,1 %
Rata – rata hasil	: 6,4 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,8 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, agak rentan terhadap biotipe 2 dan 3
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak rentan terhadap patotipe IV dan VIII, rentan terhadap tungro, agak tahan terhadap blas ras 033, rentan terhadap ras 133, 073 dan 173.
Anjuran tanam	: Cocok untuk ditanam diekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl dan tidak dianjurkan ditanam didaerah endemik tungro.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Nafisah, Trias Sitaresmi, Cucu Gunarsih, dan Bambang Suprihatno.
Dilepas tahun	: 2011

# Inpari Sidenuk

Nomor seleksi	: OBS1703-PSJ
Asal seleksi	: Diah Suci diradiasi sinar gamma dengan dosis 0,20 kGy dari 60Co
Umur tanaman	: ±103 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±104 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 20,6 %
Rata – rata hasil	: 6,9 t/ha GKG
Potensi hasil	: 9,1 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, rentan terhadap patotipe IV, agak rentan terhadap patotipe VIII, rentan terhadap tungro, rentan terhadap semua ras blas.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem sawah dataran rendah sampai ketinggian 600 m dpl dan tidak dianjurkan ditanam di daerah endemik tungro dan blas.
Pemulia	: Mugiono, Hambali, Sutisna, dan Yulidar
Dilepas tahun	: 2011

# Inpari 21 Batipuah

Nomor seleksi	: BP1804-1f-7
Asal seleksi	: Sitali/ S3383-1d-Pn-16-2/ S969B-265-1-4-1
Umur tanaman	: ±120 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Sedang
Tinggi tanaman	: ±96 cm
Daun bendera	: Agak tegak
Bentuk gabah	: Sedang dan agak bulat
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pera
Kadar Amilosa	: 26 %
Rata – rata hasil	: 6,4 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,2 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap strain IV dan VIII, tahan terhadap blas ras 033, agak tahan terhadap ras 133 dan 073, rentan terhadap ras 173, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem sawah sampai ketinggian 600 m dpl.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Syahrul Zein, dan Abd. Azis Syarif.
Dilepas tahun	: 2012



# Inpari 22

Nomor seleksi	: BP3300-2C-2-3
Asal seleksi	: IR42/IRBB5// CIHERANG/// TOWUTI
Umur tanaman	: ±118 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±103 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 21,9 %
Rata – rata hasil	: 5,8 t/ha GKG
Potensi hasil	: 7,9 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, 2, dan 3
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, rentan terhadap patotipe IV dan VIII, tahan terhadap blas ras 033 dan 133, agak tahan terhadap ras 073 dan 137, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam disawah dataran rendah (0-600 m dpl) dan tidak dianjurkan ditanam didaerah endemik tungro.
Pemulia	: Aan A. Daradjat, Bambang Suprihatno, Nafisah, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi.
Dilepas tahun	: 2012

# Inpari 23 Bantul

Nomor seleksi	: B11955-MR-84-1-4
Asal seleksi	: B11738 <sup>RS</sup> (Gilirang/ BP342F-MR-1-3// Gilirang)
Umur tanaman	: ±113 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±112 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Gemuk/ lonjong
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 17 %
Rata – rata hasil	: 6,9 t/ha GKG
Potensi hasil	: 9,2 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, agak tahan biotipe 2 dan 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap patotipe IV, rentan terhadap patotipe VIII.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam disawah dataran rendah sampai sedang (0-600 m dpl).
Pemulia	: Buang Abdullah, Sularjo, Heni Safitri, Cahyono, dan Bambang Kustianto.
Dilepas tahun	: 2012

## INPARI 24 GABUSAN

Nomor seleksi	:	B11844-MR-7-17-3
Asal seleksi	:	Bio 12 – MR-1-4-PN-6/ Beras merah
Umur tanaman	:	±111 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	±106 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Ramping
Warna gabah	:	Kuning
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Tahan
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar Amilosa	:	18 %
Rata – rata hasil	:	6,7 t/ha GKG
Potensi hasil	:	7,7 t/ha GKG
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak rentan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	:	Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap patotipe IV, agak rentan terhadap patotipe VIII.
Anjuran tanam	:	Cocok ditanam disawah dataran rendah sampai sedang (0-600 m dpl).
Pemulia	:	Buang Abdullah, Sularjo, Heni Safitri, Cahyono, dan Bambang Kustianto.
Dilepas tahun	:	2012

## INPARI 25 OPAK JAYA

Nomor seleksi	:	BP1002E-MR-2
Asal seleksi	:	BIO 530C-MR-1/ IRBB 21
Umur tanaman	:	±115 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	±115 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Ramping
Warna gabah	:	Kuning
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Tahan
Tekstur nasi	:	Ketan
Kadar Amilosa	:	5,7 %
Rata – rata hasil	:	7,0 t/ha GKG
Potensi hasil	:	9,4 t/ha GKG
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, agak rentan terhadap biotipe 2 dan 3.
• Penyakit	:	Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap patotipe IV dan VIII.
Anjuran tanam	:	Cocok untuk ditanam disawah dataran rendah sampai sedang (0-600 m dpl).
Pemulia	:	Buang Abdullah, Sularjo, Heni Safitri, Cahyono, dan Suwarno
Dilepas tahun	:	2012

## INPARI 26

Nomor seleksi	: BARKAT (K78-13) – KN-B
Asal seleksi	: Introduksi dari IRRI (SHINEI/CHINA 971)
Umur tanaman	: ±124 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±80 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 20,9 %
Rata – rata hasil	: 5,7 t/ha GKG
Potensi hasil	: 7,9 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap strain IV dan VIII, tahan terhadap blas ras 033, agak tahan terhadap ras 073 dan 173, rentan terhadap ras 133, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem lahan sawah dataran tinggi sampai ketinggian 900 m dpl.
Pemulia	: IRRI, Aan A. Daradjat, Nafisah, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi.
Dilepas tahun	: 2012

## INPARI 27

Nomor seleksi	: 87025-TR973-3-1-1-KN-B
Asal seleksi	: Introduksi dari IRRI (BALDO/7904-TR4-4-2-1-1)
Umur tanaman	: ±125 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±81 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar Amilosa	: 21,8 %
Rata – rata hasil	: 5,7 t/ha GKG
Potensi hasil	: 7,6 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan terhadap biotipe 3.
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap strain IV dan VIII, tahan terhadap blas ras 073, agak tahan terhadap ras 173, rentan terhadap ras 033 dan 133, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di ekosistem lahan sawah sampai ketinggian 900 m dpl.
Pemulia	: IRRI, Aan A. Daradjat, Nafisah, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi.
Dilepas tahun	: 2012

## INPARI 28 KERINCI

Nomor seleksi	:	RUTTST85B-5-2-2-2-0-J
Asal seleksi	:	IR 63872-14-2-2-1/ CEA-1
Umur tanaman	:	±120 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	±97 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Ramping
Warna gabah	:	Kuning bersih
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Tahan
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar Amilosa	:	23,7 %
Rata – rata hasil	:	6,6 t/ha GKG
Potensi hasil	:	9,5 t/ha GKG
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak rentan terhadap wereng batang cokelat biotipe 1, 2, dan 3.
• Penyakit	:	Tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap strain IV dan VIII, agak tahan terhadap blas ras 033 dan 073, rentan terhadap ras 133 dan 173, rentan terhadap tungro.
Anjuran tanam	:	Cocok ditanam di ekosistem sawah sampai ketinggian 1100 m dpl.
Pemulia	:	Aan A. Daradjat, Nafisah, Cucu Gunarsih, dan Trias Sitaresmi.
Dilepas tahun	:	2012

## INPARI 29 RENDAMAN

Nomor seleksi	:	B13138-7-MR-2-KA-1
Asal seleksi	:	IR69502-6-SKN-UBN-1-B-1-3/ KAL-9418F// Pokhali/ Angke
Umur tanaman	:	±110 hari setelah semai
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	±103 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Panjang ramping
Warna gabah	:	Kuning bersih
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Sedang
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar Amilosa	:	21,1 %
Rata – rata hasil	:	6,5 t/ha
Potensi hasil	:	9,5 t/ha
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, rentan terhadap biotipe 2 dan 3.
• Penyakit	:	Agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, rentan terhadap patotipe IV dan VIII.
Anjuran tanam	:	Cocok untuk ditanam disawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian 400 m dpl terutama didaerah rawan banjir dengan rendaman keseluruhan fase vegetative selama lebih dari 14 hari.
Pemulia	:	Yudhistira Nugraha, Supartopo, dan Suwarno.
Dilepas tahun	:	2012



## INPARI 30 CIHERANG SUB 1

Nomor seleksi	:	IR09F436
Asal seleksi	:	Ciherang/ IR64Sub1/Ciherang
Umur tanaman	:	111 hari setelah semai
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	101 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Panjang ramping
Warna gabah	:	Kuning bersih
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Sedang
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar Amilosa	:	22,4 %
Rata – rata hasil	:	7,2 t/ha
Potensi hasil	:	9,6 t/ha
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan biotipe 3.
• Penyakit	:	Agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe III. Rentan terhadap patotipe IV dan VIII.
Anjuran tanam	:	Cocok untuk ditanam disawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian 400 m dpl didaerah luapan sungai, cekungan dan rawan banjir lainnya dengan rendaman keseluruhan fase vegetative selama 15 hari.
Pemulia	:	Yudhistira Nugraha, Supartopo, Nurul Hidayatun, Endang Septiningsih (IRRI), Alfaro Pamplona (IRRI), dan David J Mackill (IRRI).
Dilepas tahun	:	2012

# Maro

Nomor seleksi	: H2
Asal seleksi	: IR58025A/IR53942
Umur tanaman	: 113 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 98 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 22,8%
Rata – rata hasil	: 6,24 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,85 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3
• Penyakit	: Rentan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV
Anjuran tanam	: Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi bukan daerah endemi virus tungro dan hama wereng coklat.
Pemulia	: Suwarno, B. Sutaryo, Yuniati P.M., Murdani Diredja, dan B. Suprihatno
Dilepas tahun	: 2002

# Rokan

Nomor seleksi	: H1
Asal seleksi	: IR58025A/BR827-35
Umur tanaman	: 115 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 107 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping, kadang Berbulu
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 23,1%
Rata – rata hasil	: 6,44 t/ha GKG
Potensi hasil	: 9,24 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3
• Penyakit	: Peka terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV
Anjuran tanam	: Baik ditanam untuk lahan sawah irigasi bukan daerah endemik virus tungro dan hama wereng coklat
Pemulia	: Suwarno, B. Sutaryo, Yuniati P.M., Murdani Diredja, dan B. Suprihatno
Dilepas tahun	: 2002

# Hipa 3

Nomor seleksi	: H4
Asal seleksi	: Persilangan A1/ R3
Umur tanaman	: 116 – 120 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 96 – 105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Mudah
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Sedang
Kadar amilosa	: 23,0%
Rata – rata hasil	: 8,5 t/ha
Potensi hasil	: 11,67 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain IV dan VIII, agak tahan terhadap tungro
Anjuran tanam	: Dianjurkan ditanam mengikuti kaidah PTT
Pemulia	: Suwarno, Satoto, E. Lubis, Allidawati, Yuniati P.M., Indarastuti A. Rumanti, Yudistira Nugraha, Murdani Diredja, dan Sony Suharsono
Dilepas tahun	: 2004

# Hipa 4

Nomor seleksi	: H9
Asal seleksi	: Persilangan A2/ R3
Umur tanaman	: 114 – 116 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 86 – 95 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Mudah
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pera
Kadar amilosa	: 24,7%
Rata – rata hasil	: 8,01 t/ha
Potensi hasil	: 10,43 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain IV dan VIII, agak tahan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Dianjurkan ditanam mengikuti kaidah PTT
Pemulia	: Suwarno, Satoto, Murdani D., E. Lubis, Alidawati, Yuniati P.M., Indrastuti A. Rumanti, Yudistira Nugraha, dan Sony Suharsono
Dilepas tahun	: 2004

# Hipa 5 Ceva

Nomor seleksi	: H34
Asal seleksi	: A1/R32
Umur tanaman	: 114 – 129 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 93,67 – 120,57 cm
Daun bendera	: Miring
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Mudah
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen, aromatik
Kadar amilosa	: 23,5%
Indeks glikemik	: 57,3 Gak ada di SK
Rata – rata hasil	: 7,29 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,40 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2
• Penyakit	: Agak rentan terhadap hawar daun bakteri strain IV dan VIII, agak tahan virus tungro
Anjuran tanam	: Tidak ditanam pada daerah endemik OPT
Pemulia	: Satoto, Murdani D., Yudistira Nugraha, dan Sudibyo TWU
Dilepas tahun	: 2007

# Hipa 6 Jete

Nomor seleksi	: H36
Asal seleksi	: A2/R17
Umur tanaman	: 101 – 128 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 90,20 – 119,93 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Mudah
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 21,7%
Indeks glikemik	: 57
Rata – rata hasil	: 7,36 t/ha GKG
Potensi hasil	: 10,60 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 2
• Penyakit	: Agak rentan terhadap hawar daun bakteri strain IV dan VIII, rentan virus tungro
Anjuran tanam	: Tidak ditanam pada daerah endemik OPT
Pemulia	: Satoto, Murdani D., Yudistira Nugraha, dan Sudibyو TWU
Dilepas tahun	: 2007

# Hipa 7

Nomor seleksi	: H25
Asal seleksi	: A1/R14
Umur tanaman	: ±112 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±106 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Sedang
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Agak tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 22,0%
Indeks glikemik	: 49
Rata – rata hasil	: 7,6 t/ha
Potensi hasil	: 11,4 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak rentan terhadap hawar daun bakteri strain IV dan VIII, tahan virus tungro
Anjuran tanam	: Baik ditanam pada sawah irigasi dan sawah tadah hujan
Pemulia	: Satoto, Sudibyo T. W. Utomo, Murdani Diredja
Dilepas tahun	: 2009



# Hipa 8

Nomor seleksi	: H51
Asal seleksi	: A1/PK21
Umur tanaman	: 115 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 124 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Sedang
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Agak rentan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 22,8%
Indeks glikemik	: 73,5
Rata – rata hasil	: 7,6 t/ha
Potensi hasil	: 10,4 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain IV, rentan strain VIII, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Baik ditanam pada daerah dataran rendah <450 m dpl
Pemulia	: Satoto, Sudibyo T. W. Utomo, dan Murdhani Direja
Dilepas tahun	: 2009

# Hipa 9

Nomor seleksi	:	H30
Asal seleksi	:	A1/PK12
Umur tanaman	:	±115 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	±103 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Sedang
Warna gabah	:	Kuning jerami
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Tahan
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar amilosa	:	22,3%
Indeks glikemik	:	73,5 gak ada di SK
Rata – rata hasil	:	8,1 t/ha GKG
Potensi hasil	:	10,4 t/ha GKG
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	:	Rentan terhadap tungro
		Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap hawar daun bakteri strain VIII
Anjuran tanam	:	Baik ditanam pada daerah dataran rendah <450 m dpl
Pemulia	:	Satoto, Sudibyo T. W. Utomo, dan Murdhani Direja
Dilepas tahun	:	2010

# Hipa 10

Nomor seleksi	: H47
Asal seleksi	: A6/PK18
Umur tanaman	: 114 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 97 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning emas
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 19,7%
Rata – rata hasil	: 8,1 t/ha GKG
Potensi hasil	: 9,4 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, agak rentan terhadap hawar daun bakteri strain VIII, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Baik ditanam pada daerah dataran rendah <450 m dpl.
Pemulia	: Satoto, Murdhani Direja, Sudibyo T. W. Utomo, Yuni Widyastuti, dan Indrastuti Apri Rumanti
Dilepas tahun	: 2010

# Hipa 11

Nomor seleksi	: H64
Asal seleksi	: A6/R14
Umur tanaman	: $\pm 114$ hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: $\pm 97,5$ cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning emas
Kerontokan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 20,1%
Rata – rata hasil	: 8,4 t/ha GKG
Potensi hasil	: 10,6 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak rentan hawar daun bakteri patotipe VIII, rentan terhadap virus tungro
Pemulia	: Satoto, Murdhani Direja, Sudibyo T. W. Utomo, Yuni Widyastuti, dan Indrastuti Apri Rumanti
Dilepas tahun	: 2010

# Hipa 12 SBU

Nomor seleksi	: H178
Asal seleksi	: GMJ6A/PK89
Umur tanaman	: ±105 hari setelah semai
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±104,4 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 23,2%
Rata – rata hasil	: 7,7 t/ha GKG
Potensi hasil	: MK 10,5 t/ha GKG MH 8,9 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3
• Penyakit	: Rentan terhadap hawar daun bakteri strain VIII dan agak tahan terhadap hawar bakteri patotipe III, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan irigasi dengan mengikuti anjuran PTT
Pemulia	: Satoto, Sudibyo T. W. Utomo, Murdhani Direja, Indrastuti Apri Rumanti, dan Yuni Widyastuti.
Dilepas tahun	: 2011

# Hipa 13

Nomor seleksi	: H180
Asal seleksi	: Persilangan antara GMJ6A x Restorer PK90
Umur tanaman	: ±105 hari setelah semai
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 21,8%
Rata – rata hasil	: 7,7 t/ha GKG
Potensi hasil	: MK 10,5 t/ha GKG MH 9,4 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2, rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain VIII, agak tahan terhadap hawar bakteri strain III, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan irigasi dengan mengikuti anjuran PTT
Pemulia	: Satoto, Murdhani Direja, Sudibyo T. W. Utomo, Yuni Widyastuti, dan Indrastuti Apri Rumanti
Dilepas tahun	: 2011

# Hipa 14 SBU

Nomor seleksi	: H183
Asal seleksi	: Persilangan antara CMS A7 x Restorer PK92
Umur tanaman	: $\pm$ 112 hari setelah semai
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: $\pm$ 112 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 24,7%
Rata – rata hasil	: 8,4 t/ha GKG
Potensi hasil	: MK 12,1 t/ha GKG MH 11,8 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2, rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Rentan terhadap hawar daun bakteri strain VIII, agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan irigasi dengan mengikuti anjuran PTT
Pemulia	: Satoto, Murdhani Direja, Sudibyo T. W. Utomo, Yuni Widyastuti, dan Indrastuti Apri Rumanti
Dilepas tahun	: 2011

# Hipa Jatim 1

Nomor seleksi	: H101
Asal seleksi	: Persilangan antara CMS A1/Restorer PK41
Umur tanaman	: $\pm 119$ hari setelah semai
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: $\pm 117,2$ cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 17%
Rata – rata hasil	: 8,2 t/ha GKG
Potensi hasil	: MK 10,0 t/ha GKG MH 9,7 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Tidak dianjurkan ditanam di daerah endemik hama dan penyakit utama padi
Pemulia	: Satoto, Murdhani Direja, Sudibyo T. W. Utomo, Yuni Widyastuti, dan Indrastuti Apri Rumanti
Dilepas tahun	: 2011



# Hipa Jatim 2

Nomor seleksi	: H175
Asal seleksi	: CMS A1/PK88
Umur tanaman	: ±119 hari setelah tanam
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±116 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 21,5%
Rata – rata hasil	: 9,3 t/ha GKG
Potensi hasil	: MK 10,9 t/ha GKG MH 10,7 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Tidak dianjurkan ditanam di daerah endemik hama dan penyakit utama padi
Pemulia	: Satoto, Murdhani Direja, Sudibyo T. W Utomo, Yuni Widyastuti, dan Indrastuti Apri Rumanti
Dilepas tahun	: 2011

# Hipa Jatim 3

Nomor seleksi	: H176
Asal seleksi	: A6/ PK88
Umur tanaman	: ±117 hari setelah tanam
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±109,4 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 20%
Rata – rata hasil	: 8,5 t/ha GKG
Potensi hasil	: MK 10,7 t/ha GKG MH 10,0 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Agak rentan terhadap hawar daun bakteri strain III, rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII, rentan terhadap virus tungro
Anjuran tanam	: Tidak dianjurkan ditanam di daerah endemik hama dan penyakit utama padi
Pemulia	: Satoto, Murdhani Direja, Sudibyo T. W. Utomo, Yuni Widyastuti, dan Indrastuti Apri Rumanti
Dilepas tahun	: 2011

# Situ Patenggang

Nomor seleksi	: BP1153-C-9-12
Asal seleksi	: Kartuna/TB47H-MR-10
Umur tanaman	: 110 -120 HST
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 100 – 110 cm
Daun bendera	: Menyudut 35° - 50° terhadap batang
Bentuk gabah	: Agak gemuk
Warna gabah	: Krem tua
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Sedang
Kadar amilosa	: 23,93%
Indeks glikemik	: 53,7
Rata – rata hasil	: 3,6 – 5,6 t/ha GKG
Potensi hasil	:
Ketahanan terhadap	
• Penyakit	: Tahan terhadap blas
• Sifat khusus	: Aromatik, respon terhadap pemupukan sehingga mampu di kembangkan di sawah
Anjuran tanam	: Lahan kering musim hujan, tumpangsari, lahan tipe tanah Aluvial dan Podsolik ketinggian tidak lebih dari 300 m dpl.
Pemulia	: Ismail BP, Atito D.S, Yamin S., Z.A. Simanullang, dan Aan A. Darajat
Dilepas tahun	: 2003

# Situ Bagendit

Nomor seleksi	: S4325d-1-2-3-1
Asal seleksi	: Persilangan Batur/S2823-7d-8-1-A//S283-7d-8-1-A
Umur tanaman	: 110 – 120 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 99 – 105 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang ramping
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 22%
Rata – rata hasil	: 3-5 t/ha GKG
Potensi hasil	:
Ketahanan terhadap	
• Penyakit	: Agak tahan terhadap blas Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III dan IV
Anjuran tanam	: Cocok ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah
Pemulia	: Z.A. Simanullang, Aan A. Daradjat, Ismail BP, Nani Yunani
Dilepas tahun	: 2003

# Inpago 4

Nomor seleksi	: TB490C-TB-1-2-1
Asal seleksi	: Batutegi/Cigeulis/Ciherang
Umur tanaman	: ±124 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±134 cm
Daun bendera	: Mendatar
Bentuk gabah	: Lonjong
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 21,9%
Rata – rata hasil	: 4,1 t/ha
Potensi hasil	: 6,1 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Penyakit	: Tahan terhadap beberapa ras penyakit blas
• Cekaman abiotik	: Toleran terhadap keracunan AI (60 ppm)
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan kering subur, lahan kering Podzolik merah kuning dengan tingkat keracunan AI sedang
Pemulia	: Erwina Lubis, Aris Hairmansis, B. Kustianto, S. Suharsono, dan Suwarno
Dilepas tahun	: 2010

# Inpago 5

Nomor seleksi	: B11338F-TB-26
Asal seleksi	: TB177E-TB-28-D-3/B10384E-MR-1-8-3//IR60080-23///TB177E-TB-28-D-3/B10386E-KN-36-2//BL245
Umur tanaman	: ±118 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±132 cm
Daun bendera	: Miring
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Sangat pulen
Kadar amilosa	: 18 %
Rata – rata hasil	: 4,0 t/ha
Potensi hasil	: 6,2 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Penyakit	: Tahan terhadap beberapa ras penyakit blas
• Cekaman abiotik	: Toleran terhadap kekeringan Agak toleran terhadap keracunan AI (60 ppm)
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan kering subur, lahan kering Podzolik Merah Kuning dengan tingkat keracunan AI sedang
Pemulia	: Suwarno, Erwina Lubis, Aris Hairmansis, B. Kustianto, dan Supartopo
Dilepas tahun	: 2010

# Inpago 6

Nomor seleksi	: IR30176-B-2-MR-1
Asal seleksi	: Introduksi, IRAM2165/NC1281
Umur tanaman	: ±113 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±117 cm
Daun bendera	: Tegak – Miring
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 22 %
Rata – rata hasil	: 3,9 t/ha
Potensi hasil	: 5,8 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Penyakit	: Tahan terhadap beberapa ras blas
• Cekaman abiotik	: Agak toleran terhadap keracunan AI (60 ppm)
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan kering subur, lahan kering Podzolik Merah Kuning dengan tingkat keracunan AI sedang
Pemulia	: B. Kustianto, Erwina Lubis, Aris Hairmansis, Suwarno, dan Supartopo
Dilepas tahun	: 2010

## INPAGO 7

Nomor seleksi	:	B12498E-MR-1
Asal seleksi	:	IR68886/BP68//Slegreng///Maninjau/ Asahan
Umur tanaman	:	±111 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	±107 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Sedang
Warna gabah	:	Kuning jerami
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Tahan
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar amilosa	:	20,3 %
Rata – rata hasil	:	4,6 t/ha GKG
Potensi hasil	:	7,4 t/ha GKG
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak tahan wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 3
• Penyakit	:	Tahan terhadap penyakit blas ras 133 dan agak tahan penyakit blas ras 73, 173 dan 033.
• Cekaman abiotik	:	Agak rentan terhadap kekeringan dan rentan terhadap keracunan Almunium.
Anjuran tanam	:	Baik ditanam di lahan kering dataran rendah sampai sedang <700 m dpl.
Pemulia	:	Erwin Lubis dan Suwarno
Dilepas tahun	:	2011



## INPAGO 8

Nomor seleksi	: TB409B-TB-14-3
Asal seleksi	: Cirata / TB 177
Umur tanaman	: ±119 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±122 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Panjang
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: 22,3 %
Rata – rata hasil	: 5,2 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,1 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng batang coklat
• Penyakit	: Tahan terhadap penyakit blas ras 073, 173, 033 dan 133
• Cekaman abiotik	: Toleran terhadap kekeringan, agak toleran terhadap keracunan Aluminium (Al) dan Besi (Fe)
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan kering dataran rendah sampai sedang <700 m dpl.
Pemulia	: Suwarno, Erwin Lubis dan Aris Hairmansis
Dilepas tahun	: 2011

## INPAGO 9

Nomor seleksi	: B12151D-MR-4
Asal seleksi	: UPLRI/IRAT15
Umur tanaman	: ±109 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ±115 cm
Daun bendera	: Tegak – Miring
Bentuk gabah	: Bulat besar
Warna gabah	: Kuning bergaris coklat
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Sedang
Kadar amilosa	: 22,3 %
Rata – rata hasil	: 5,2 t/ha GKG
Potensi hasil	: 8,4 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1.
• Penyakit	: Agak tahan terhadap penyakit blas ras 133, moderat terhadap penyakit blas ras 033 dan 173, agak tahan hawar daun bakteri patotipe III
• Cekaman abiotik	: Agak toleran kekeringan dan keracunan Al pada tingkat 60 ppm Al 3+.
Anjuran tanam	: Lahan subur di Jawa lahan PMK Lampung
Pemulia	: Erwin Lubis dan Suwarno
Dilepas tahun	: 2012

# INPARA 1

Nomor seleksi	:	B9852E-KA-66
Asal seleksi	:	Batang Ombilin/IR9884-54-3
Umur tanaman	:	131 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	111 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Sedang
Warna gabah	:	Kuning
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Sedang
Tekstur nasi	:	Pera
Kadar amilosa	:	27,93%
Rata – rata hasil	:	5,65 t/ha (rawa lebak) 4,45 t/ha (rawa Pasang surut)
Potensi hasil	:	6,47 t/ha
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 dan 2
• Penyakit	:	Tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III Tahan terhadap blas
• Cekaman abiotik	:	Toleran terhadap keracunan Fe dan Al
Anjuran tanam	:	Baik ditanam di daerah rawa lebak dan pasang surut
Pemulia	:	B. Kustianto, Aris Harimansis, Suwarno, dan Supartopo
Dilepas tahun	:	2008

## INPARA 2

Nomor seleksi	:	B10214F-TB-7-2-3
Asal seleksi	:	Pucuk/Cisanggarung/Sita
Umur tanaman	:	128 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	103 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Sedang
Warna gabah	:	Kuning
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Sedang
Tekstur nasi	:	Pulen
Kadar amilosa	:	22,05%
Rata – rata hasil	:	5,49 t/ha (rawa lebak) 4,82 t/ha (rawa pasang surut)
Potensi hasil	:	6,08 t/ha
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 2
• Penyakit	:	Tahan terhadap hawar daun patotipe III Tahan terhadap blas
• Cekaman abiotik	:	Toleran terhadap keracunan Fe dan Al
Anjuran tanam	:	Baik ditanam di daerah rawa lebak dan pasang surut
Pemulia	:	B. Kustianto, Aris Harimansis, Suwarno, dan Supartopo
Dilepas tahun	:	2008

## INPARA 3

Nomor seleksi	:	IR70213-9-CPA-12-UBN-2-1-3-1
Asal seleksi	:	IR69256/IR43524-55-1-3-2
Umur tanaman	:	127 hari
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	108 cm
Daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Sedang
Warna gabah	:	Kuning
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Sedang
Tekstur nasi	:	Pera
Kadar amilosa	:	28,6%
Indeks glikemik	:	59,2
Rata – rata hasil	:	4,6 t/ha
Potensi hasil	:	5,6 t/ha
Ketahanan terhadap		
• Hama	:	Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	:	Tahan terhadap blas 101, 123, 141, dan 373 Rentan terhadap hawar dan bakteri
• Cekaman abiotik	:	Agak toleran terhadap rendaman selama 6 hari pada fase vegetatif Agak toleran terhadap keracunan Fe dan Al
Anjuran tanam	:	Baik ditanam di daerah rawa lebak, rawa pasang surut potensial dan di sawah irigasi yang rawan terhadap banjir
Pemulia	:	Aris Harimansis, B. Kustianto, Suwarno, dan Supartopo , Izar Khairullah, dan S. Sarkarung (IRRI)

## INPARA 4

Nomor seleksi	: IR05F101
Asal seleksi	: Introduksi dari IRRI
Umur tanaman	: 135 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 94 cm
Daun bendera	: Tegak
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Pera
Kadar amilosa	: 29%
Indeks glikemik	: 50,9
Rata – rata hasil	: 4,7 t/ha
Potensi hasil	: 7,6 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak tahan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun patotipe IV dan VIII
• Cekaman abiotik	: Toleran terendam selama 14 hari pada fase vegetatif
Anjuran tanam	: Baik ditanam di daerah rawa lebak dangkal dan sawah rawan banjir
Pemulia	: D.J. Mackill, A.M. Pamplona (IRRI), Aris Hairmarisis, Bambang Kustianto, Supartopo, dan Suwarno
Dilepas tahun	: 2010

## INPARA 5

Nomor seleksi	: IR07F102
Asal seleksi	: Introduksi dari IRRI
Umur tanaman	: 115 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 92 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping
Warna gabah	: Kuning
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang
Tekstur nasi	: Sedang
Kadar amilosa	: 25,2 %
Indeks glikemik	: 59
Rata – rata hasil	: 4,5 t/ha
Potensi hasil	: 7,2 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Agak rentan terhadap wereng coklat biotipe 3
• Penyakit	: Tahan terhadap hawar daun patotipe IV dan VIII
• Cekaman abiotik	: Toleran terendam selama 14 hari pada fase vegetatif
Anjuran tanam	: Baik ditanam di daerah rawa lebak dangkal dan sawah rawan banjir
Pemulia	: D.J. Mackill, A.M. Pamplona (IRRI), Aris Hairmarisis, Bambang Kustionto, Supartopo, dan Suwarno
Dilepas tahun	: 2010

## INPARA 6

Nomor seleksi	: B10528F-KN-35-2-2
Asal seleksi	: IR64/IRBB21//IR51672
Umur tanaman	: 117 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: 99 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Sedang
Warna gabah	: Kuning bersih
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Tahan
Tekstur nasi	: Sedang
Kadar amilosa	: 24 %
Rata – rata hasil	: 4,7 t/ha
Potensi hasil	: 6,0 t/ha
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Rentan terhadap wereng coklat
• Penyakit	: Tahan terhadap blas Agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe IV
• Cekaman abiotik	: Toleran terhadap keracunan Fe
Anjuran tanam	: Baik ditanam di daerah rawa pasang surut sulfat masam potensial dan rawa lebak
Pemulia	: Aris Hairmansis, Bambang Kustianto, Suprpto, dan Suwarno
Dilepas tahun	: 2010



## INPARA 7

Nomor seleksi	: B11844-MR28-7-1
Asal seleksi	: Bio 12 / Beras Merah
Umur tanaman	: ± 114 hari
Bentuk tanaman	: Tegak
Tinggi tanaman	: ± 88 cm
Daun bendera	: Tegak
Bentuk gabah	: Ramping panjang
Warna gabah	: Kuning jerami
Kerontokan	: Sedang
Kerebahan	: Sedang - Tahan
Tekstur nasi	: Pulen
Kadar amilosa	: ± 20 %
Rata – rata hasil	: 4,5 t/ha GKG
Potensi hasil	: 5,1 t/ha GKG
Ketahanan terhadap	
• Hama	: Tidak tahan terhadap wereng batang coklat
• Penyakit	: Agak tahan terhadap tungro isolat Subang, tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan 173 serta agak tahan penyakit blas ras 133
• Cekaman abiotik	: Agak toleran terhadap keracunan Fe dan Al
Anjuran tanam	: Baik ditanam di lahan rawa pasang surut dan lebak.
Pemulia	: Suwarno, Supartopo, Yudistira Nugraha
Dilepas tahun	: 2012